

**PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO**  
(deliberazione n° 7/2015 del Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015)

**MISURE DA ADOTTARE IN AREA RISICOLA**

**Oxadiazon**

**Riso coltivato in sommersione (sia con semina in acqua, sia interrata seguita da sommersione)**

- Dose massima utilizzabile 0,8 l/ha (non genera resistenze)
- Effettuare un unico trattamento, entro 7 giorni prima della semina in acqua
- Non scaricare l'acqua nei canali nei primi 5 giorni dopo il trattamento
- Utilizzare ugelli di fine barra a getto tagliato per evitare la deriva e /o la distribuzione eventuale in prossimità dei corsi d'acqua adiacenti alle risaie

**Riso coltivato in asciutta (con semina interrata e irrigazione turnata)**

- Dose massima utilizzabile 1,5 l/ha
- Effettuare un unico trattamento, in pre-emergenza

**Quinclorac**

- Mantenere bocchette di uscita chiuse per almeno 7 giorni dal trattamento
- Utilizzare ugelli di fine barra a getto tagliato per evitare la deriva e /o la distribuzione eventuale in prossimità dei corsi d'acqua adiacenti alle risaie

**Triciclazolo e Azoxistrobina**

- Un solo trattamento/anno sulle varietà meno sensibili al brusone
- Nelle varietà più sensibili ammesso un secondo trattamento con un fungicida diverso da quello impiegato nel primo trattamento
- Non aprire le bocchette di uscita per 7 gg. a partire dal trattamento
- Utilizzare ugelli di fine barra a getto tagliato per evitare la deriva e /o la distribuzione eventuale in prossimità dei corsi d'acqua adiacenti alle risaie