

<b>Disposizioni regionali</b>	
<b>Regione Piemonte</b>	<b>Regione Lombardia</b>
azoxystrobin + difenoconazolo	Nessuna limitazione
azoxystrobin	
picoxystrobin	
futriafol	
un intervento per tutte le varietà	
secondo intervento è permesso solo sulle varietà suscettibili e moderatamente suscettibili (ved. tabella sottostante), utilizzando una sostanza attiva diversa da quella impiegata nel primo intervento.	
Non aprire le bocchette di uscita per 7 gg. a partire dal trattamento Utilizzare ugelli di fine barra a getto tagliato per evitare la deriva e /o la distribuzione eventuale in prossimità dei corsi d'acqua adiacenti alle risai	

<b>Disciplinari Produzione Integrata</b>	
<b>Regione Piemonte</b>	<b>Regione Lombardia</b>
azoxystrobin + difenoconazolo	azoxystrobin + difenoconazolo
azoxystrobin	azoxystrobin
picoxystrobin	
futriafol	
un intervento per tutte le varietà	un solo intervento per tutte le varietà
secondo intervento è permesso solo sulle varietà suscettibili e moderatamente suscettibili (ved. tabella sottostante), utilizzando una sostanza attiva diversa da quella impiegata nel primo intervento.	